



Warenzeichen: QIAGEN®, digene® (QIAGEN Gruppe).
1058103 07/2009 © 2009 QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.

* Dysplasiesprechstunde = Differentialkoloskopie mit Biopsie eventueller Herdbefunde
† Bei Pap III mit dringendem Verdacht auf höhergradige Atypie in jedem Fall rasche diagnostische Abklärung.

Auszug aus den Leitlinien der Gynäkologie und Geburtshilfe 2008 – 2010:
Prävention, Diagnostik und Therapie der HPV-Infektion und präinvasiver Läsionen des weiblichen Genitale.
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe DGGG e.V. (2008)

HPV-Diagnostik im Zervix-Screening


The *digene* HPV Test

Empfehlungen zur Diagnostik
der HPV-Infektion



Wann sollte ein HPV-Test durchgeführt werden?

Als Ergänzung zum zytologischen Befund wird der HPV-Test für Frauen ab 30 Jahren empfohlen.



Indikationen zur HPV-Testung nach der DGGG-Leitlinie (Zusammenfassung)

- Ergänzung der zytologischen Vorsorge bei Frauen ab 30 Jahren
- Bei zytologischen, anamnestischen oder kolposkopischen Auffälligkeiten
- Nach Therapie von Dysplasien